



Le cancer des testicules

Le testicule à deux fonctions :

La sécrétion de testostérone (*l'hormone mâle*) et la production de spermatozoïdes.

Il existe deux types de cancer du testicule : séminomateux et non séminomateux. Le terme « séminomateux » fait référence aux [cellules germinales](#) (*les cellules de la reproduction qui sont présentes dans le [testicule](#)*).

Facteurs de risques :

- Avoir un testicule qui n'est pas descendu dans le scrotum à la naissance (cryptorchidie) ;
- Avoir déjà eu un cancer du testicule;
- Avoir un parent qui a déjà eu un cancer du testicule;
- Avoir eu un problème du développement des testicules pendant l'enfance.
- Le cancer du testicule peut se développer même en cas d'absence de ces facteurs.
- L'auto-examen est une bonne pratique et est fortement indiqué pour tous les hommes.

Signes observables :

Une bosse sur un testicule (*boule dure présente sous la peau*).

Une douleur dans un testicule.

Autres signes éventuels :

Une sensation de lourdeur ou des tiraillements dans le bas du ventre ou le scrotum. Une douleur faible mais constante dans le bas de l'abdomen et à l'aîne.

Ces symptômes ne peuvent pas être exclusivement associés à un cancer. Leur cause peut être tout autre. La meilleure des attitudes à adopter est de consulter votre médecin en cas d'apparition de ces signes ou en cas de doute.

Le rôle du dépistage est majeur puisqu'il permet de traiter efficacement plus de 95% des cas si le diagnostic est précoce.

Un cancer rare
1 à 2 %
des cancers de l'homme

Touche les jeunes entre 15 et 35 ans

Taux de guérison > à 90%